MODELISATION MésO-NH 3D

Cas réel Canicule d'avril 2010 sur l'Afrique de l'Ouest

**ANR ACASIS (Alerte Canicules
Sahel et Impact Santé) 2014-18 :**

- ★ Compréhension Canicule
- ★ Amélioration des modèles
- ★ Volet sociétal : santé, ...
- ★ Situation différente de AMMA

CNRM/GMME/MOANA :

- ★ Mireille Tomasini
- ★ Françoise Guichard
- ★ Fleur Couvreur

Motivations d'ACASIS

Guichard et al. (2014)

- ★ Plus fort réchauffement au printemps (+2°) au Sahel, moment où la température est déjà critique
 - ★ Evaluation de la capacité des modèles de climat à reproduire ces fortes températures et la tendance associée ?
- Cf. déjà forte dispersion de T entre réanalyses (écart >5° pendant la mousson sur le Sahara)
(Roehrig et al., J. Climate 2013)

Choix de la période : 10-20/04/10

Record
50°C à
Niamey le
19/04/10,
Idem au
Mali,
Burkina,
Tchad,
Sénégal.
Décèsx2

Guichard
et al.
(2014)

Anomalies / 30 ans de données ERA-Interim
<14°N-16°N>

Situation synoptique du 10 au 20 avril 2010

Analyses ECMWF

- ★ SST Atlantique en anomalie très chaude
- ★ Dépression stationnaire au large du Maroc ventilant le Sahara et empêchant l'intrusion d'air humide de la Méditerranée => Intensification et extension de la dépression thermique saharienne => Augmentation des Tmax surtout au nord du FIT et à l'Est
- ★ Dorsale SW/NE de fort Td (humidité) augmentant les Tmin surtout au sud du FIT et à l'ouest
- ★ Remontée du FIT à partir du 13/04 (~16° du 15-17/04)

Pmer 1000 à 1010 hPa

15/04/10

Dew-point Temperature at 2m and Wind at 950 hPa

Init: 2010-04-15

Forecast: 2010-04-15 (J+00)

11/04/10

17/04/10

13/04/10

19/04/10

Site MISVA :
isv.sedoo.fr
Fig. R. Roehrig

Caractéristiques des simulations

Premières simulations de ce cas d'inter-comparaison de modèles régionaux et globaux

- ★ Sur 10 jours
- ★ Maille 25x25km² ou 5x5km²
- ★ 65 niveaux (premier à 10m)
- ★ Initialisation et couplage aux bords avec les 40 réanalyses du CEP (toutes les 6h et à 25km)
- ★ ISBA avec ecoclimats_v2
- ★ Schéma de rayonnement du CEP
- ★ Schéma de convection profonde Kain-Fritsch-Bechtold & peu profonde Eddy-Diffusivity-KF
- ★ Microphysique ICE3 (6 hydrométéores)
- ★ TKE prognostique (fermeture à l'ordre 1,5 avec BL89)

19/01/16

5

Simulations et données

★ 5 simulations différentes :

Nom	Résolution	Domaine	Convection profonde paramétrée (schéma KAFR)	Convection peu profonde paramétrée (schéma EDKF)	Appel du schéma de rayonnement
MNH1	25 km	Grand	x	x	2/3h
MNH2	25 km	Petit	x	x	2/3h
MNH3	5 km	Petit	x	x	2/3h
MNH4	5 km	Petit			2/3h
MNH4D	5 km	Petit		x	5/15mn

★ Données pour l'évaluation des simulations :

- SYNOP (~40 stations)
- Stations météo automatique et de flux AMMA-CATCH (3 sites)
- Radiosondages (~ 10 sur l'Afrique de l'Ouest)
- Eau précipitable GPS (Djougou, Niamey, Ouagadougou)
- Satellites (AOD Deep Blue, CERES, MSG, TRMM, RFE2, flux radiatifs)

Comparaison au couplage : MNH- CEP

rV (g/kg, <5W-3E>, 30m)

MNH1=Grand Domaine à 25km

MNH2=Petit Domaine à 25km

MNH3=Petit Domaine à 5km

MNH4=Petit Domaine à 5km
sans schéma de convection

MNH4D=Petit Domaine à 5km
EDKF seulement

=> Biais réglé mais
reste un problème de cycle diurne

=> Problème de cycle diurne moins fort

Pluie non résolue et résolue <5W-3E>

Thermodynamique et bilan énergétique à la surface : évaluation

Exemple d'AGOUFU (même conclusion avec les données du Niger)

★ Sans schéma de convection profonde, **rv + en accord avec les obs**

★ Elimination des pluies => Le flux de chaleur latente devient négligeable et T2m ↑ en accord avec les obs

★ Moyenne de la corrélation sur les 10 jours de T et Rv entre MNH4 et AWS de 0,85

★ La chute de Rnet en fin de simulation n'est pas vue : aérosols ou nuages ?

EAU PRECIPITABLE (PW) : comparaison **simulations-observations GPS**

Simulation MNH1
*trop forte
augmentation de la
vapeur d'eau au Sahel
(i.e. le problème n'est
pas qu'à la surface)*

Simulation MNH4
*Le biais est en grande
partie corrigé
On simule bien la
diminution de PW
après le 18 avril*

↑ *Profils verticaux*

Simulation MNH1
*Plus au sud, à
Djougou, la
simulation est plus en
accord avec les
données*

★ Les biais des simulations avec schéma de convection profonde notés à la surface et en intégrale sur l'atmosphère (eau précipitable) affectent toute la couche limite

➡ *Biais froid (~ 4K) et humide (> 6g.kg⁻¹)*

➡ *Le biais est largement réduit*

★ Le schéma de convection peu profonde EDKF améliore aussi un peu les profils par un meilleur mélange en journée

<5W-3E>

$T'x$

T2m MNH4D - Obs BEST

- ★ Plutôt un biais froid confirmé à ponctuellement avec le réseau de stations automatiques et SYNOP
- ★ Interpolation à 2m d'ISBA entre le premier niveau 10m et la surface trop froide surtout dans les minima car très forte inversion la nuit

$T'm$

TH10m MNH4D - CEP

toutes les 6h

$T'n$

- ★ Plutôt un biais chaud dans la CLA sauf à 12h

AEROSOLS

AOD MNH pour les aérosols désertiques : Tegen etal 97

- ★ Bon AOD important car comme les nuages, ils refroidissent la surface (SW <<, LW >) et réchauffent l'atmosphère (SW&LW >)
- ★ Tegen etal 97 sous-estime entre 3 à 4 fois l'AOD sur la boîte Sahélienne en 2010 (mais même / clim : facteur 2)

Apr 2010 AOD MODIS (unitless)

1,3 à 1,4 pour 0,55µ soit les aérosols désertiques

AOD Deep Blue land 0.55µ : Apr climatology (2002-12)

- 0.00- 0.10
- 0.10- 0.20
- 0.20- 0.30
- 0.30- 0.40
- 0.40- 0.50
- 0.50- 0.60
- 0.60- 0.70
- 0.70- 0.80
- 0.80- 0.90
- 0.90- 1.00
- 1.00- 1.10
- 1.10- 1.20
- 1.20- 5.00

AOD (unitless) CERES <5W-3E>

Anomalie Avril 2010

- [-1.00, -0.80]
- [-0.80, -0.60]
- [-0.60, -0.40]
- [-0.40, -0.20]
- [-0.20, 0.00]
- [0.00, 0.20]
- [0.20, 0.40]
- [0.40, 0.60]
- [0.60, 0.80]
- [0.80, 1.00]
- [1.00, 1.20]

★ Variabilité journalière non prise en compte dans MNH

Sensibilité aux aérosols

★ Par rapport à
« **TEGEN** »,
« **SURF** » a
+10 % de
SWD pour
Tmax =

et

« **TEGENx3** »

a -20 % de
SWD pour -1°

★ Ajustement du
flux solaire en
ciel clair à
50w/m² près

★ Pas de
variabilité
journalière
préjudiciable

(W/m²) **Agoufou** : Flux solaire descendant à la surface (SWD)

(°C) **Agoufou** : T2m issu d'ISBA interpolées entre la surface et le premier niveau (10m)

Couverture nuageuse

- ★ Analyse en cours
- ★ Manque de couvert nuageux notamment du 17 au 19/04/10

MODIS
18/04/10 13h40 Cloud Top Pressure

Conclusions-*Perspectives*

- ★ **Validation** extensive à partir d'un ensemble d'observations en cours
- ★ **Les simulations plus contraintes par l'analyse sont meilleures**
- ★ **La paramétrisation de la convection profonde détériore les simulations des vagues de chaleur** (test à la *sensibilité τ_{adjust}*)
- ★ **La paramétrisation de la convection peu profonde EDKF** améliore la simulation
- ★ **Comparaison T2m avec les OBS** : Délicate mais on observe un biais froid (*test de sensibilité à la grille verticale en cours*)
- ★ **Aérosols** : Période caractérisée par de fortes AOD, sensibilité des résultats aux valeurs d'AOD. (*Intérêt potentiel du module d'aérosols pour la variabilité journalière*)
- ★ *Sensibilité à la résolution horizontale* : impacts sur couche limite, nuages...
- ★ *Sensibilité au couplage avec ERA-INTERIM* (notamment pour la future intercomparaison)
- ★ **Compréhension des processus en jeu lors de la canicule** : Bilans, ...