Travaux récents sur la prévision du brouillard avec AROME

Y. Seity, C. Lac, F. Burnet et B. Vié (CNRM), V. Homonnai (Met-Hu),
F. Mallet, S. Van Hyfte et J. Wurtz (ENM),

AMA

Toulouse, 14 Février 2018

Plan

- Présentation de la campagne BURE-2015
- Validation du terme de dépôt dans AROME
- Initialisation de la microphysique LIMA
- Conclusions/Perspectives

Brouillard : Campagne BURE 2015

**Campagne de mesures du CNRM/GMEI
à la station atmosphérique de
l'Observatoire Pérenne de
l'Environnement de l'Agence Nationale
pour la Gestion des Déchets Radioactifs
qui a eu lieu à l'automne/hiver 2015-2016**

Instruments

→ Données provenant de 3 niveaux d'altitude différentes :

● 120 mètres : visibilité (PWD22)

● 50 mètres : LWC et PSA (PVM-100)

● 10 mètres : visibilité (PWD22) ; LWC et PSA (FM-100)

PWD : Present Weather Detector
PVM : Present Volume Monitor
FM : Fog Monitor
PSA : Particule Surface Area

Modèle AROME utilisé

- Résolution horizontale : 1,3km (180x180 points)
- Résolution verticale : 90 niveaux
- Couplé et initialisé par AROME-opérationnel
- Reproduction des prévisions opérationnelles à moindre coût
- Sorties toutes les 10 minutes de fichiers extraits des simulations

Différents types de brouillard

→ Brouillard de rayonnement

Ex : 01/11/2015

Différents types de brouillard

→ Brouillard de rayonnement

Ex : 01/11/2015

→ Brouillard par affaissement de Stratus

Ex : 25/10/2015

Différents types de brouillard

→ Brouillard de rayonnement

Ex : 01/11/2015

→ Brouillard par affaissement de Stratus

Ex : 25/10/2015

→ Stratus

Ex : 24/11/2015

Différents types de brouillard

→ Brouillard de rayonnement

Ex : 01/11/2015

→ Brouillard par affaissement de Stratus

Ex : 25/10/2015

→ Stratus

Ex : 24/11/2015

Type de brouillard	Nombre de cas
Brouillard de rayonnement	17 cas
Brouillard par affaissement de Stratus	11 cas
Stratus	26 cas

Brouillard : Campagne BURE 2015

→ MesoNH/AROME surestiment LWC dans les brouillards (Mazoyer et al. 2017, ACP)

→ Un nouveau processus a été rajouté au plus bas niveau modèle :
Déposition de gouttelettes sur la végétation (interception des gouttelettes par la végétation)

$$F_{\text{DEP}} = \rho_a \cdot r_c \cdot V_{\text{DEP}} \text{ avec } V_{\text{DEP}} = 2\text{cm/s}$$

→ Validation dans AROME à l'aide de BURE_2015

Impact du dépôt sur le brouillard

→ Brouillard de rayonnement

01/11/2015

LWC

Sans dépôt :

Avec dépôt :

Impact du dépôt sur le brouillard

→ Brouillard de rayonnement

01/11/2015

LWC

→ Brouillard par affaissement de Stratus

25/10/2015

Sans dépôt :

Avec dépôt :

Sans dépôt :

Avec dépôt :

Impact du dépôt sur le brouillard

→ Brouillard de rayonnement

01/11/2015

LWC

→ Brouillard par affaissement de Stratus

25/10/2015

Sans dépôt :

Avec dépôt :

Sans dépôt :

Avec dépôt :

→ Stratus

24/11/2015

Impact du dépôt sur le brouillard

→ Brouillard de rayonnement

01/11/2015

LWC

→ Brouillard par affaissement de Stratus

25/10/2015

Sans dépôt :

Avec dépôt :

Sans dépôt :

Avec dépôt :

→ Stratus

24/11/2015

- Impact principalement dans les cas radiatifs :
- LWC réduit pas seulement proche de la surface
 - Cycle diurne modifié

Tables de contingence LWC @10m

	<i>Sans dépôt</i>	<i>Avec dépôt</i>
<i>bonne détection</i>	32%	36%
<i>sur-estimation</i>	35%	19%
<i>sous-estimation</i>	33%	45%

→ calculées sur les 39 jours

Tables de Contingence des valeurs de LWC@50m

	<i>Simulation de référence</i>	<i>Simulation avec dépôt</i>
<i>Bonne détection</i>	35%	34%
<i>Surestimation</i>	24%	19%
<i>Sous-estimation</i>	41%	47%

Histogrammes des valeurs de LWC à 10m et à 50m

Initialisation du schéma LIMA (Liquid Ice Multiple Aérosols)

→ LIMA est un schéma de microphysique mixte à 2 moments (N_i , N_c , N_r) développé initialement dans MesoNH pour mieux représenter les interactions nuages/aérosols/rayonnement.

(Vié et al., 2016, LIMA (v1.0) : a two-moment microphysics scheme driven by a multimodal population of cloud condensation and ice freezing nuclei, GMD, doi:10.5194/gmd-9-567-2016)

→ Dérivé d'ICE3, avec certains processus plus physiques (ex:autoconversion de la neige)

Il a été implémenté dans AROME

→ Il a besoin de distributions d'aérosols pour démarrer (Log-Normales). Valeurs climatologiques ou constantes dans les premiers tests.

→ Récemment, une filière d'initialisation plus réaliste via des modèles de chimie/aérosols a été développée.

→ Tests sur les cas de BURE-2015

Initialisation de LIMA à partir de C-IFS

→ 15 variables pronostiques supplémentaires : $N_r, N_i, N_c, N_{CCN_F/A_1-3}, N_{IFN_F/A_1-2}, N_{IFN_COAT}, N_{CCN_FR}$

Initialisation de LIMA à partir de MOCAGE

CAS du 01-11-2015

ICE3-Ref

LWC

LIMA-Clim

LIMA-CIFS

LIMA-MOC

CAS du 01-11-2015

ICE3-Ref

LWC

ICE3-Ref

Précipitations cumulées sur 24h

LIMA-Clim

LIMA-Clim

LIMA-CIFS

LIMA-MOC

LIMA-CIFS

LIMA-MOC

Pas d'impact de l'initialisation MOCAGE, mais LWC plus faibles avec C-IFS et plus de précipitations (moins d'aérosols → gouttelettes plus grosses → pluie)

CAS du 25-10-2015

ICE3-Ref

LWC

ICE3-Ref

Précipitations
cumulées sur 24h

LIMA-Clim

LIMA-Clim

LIMA-CIFS

LIMA-MOC

LIMA-CIFS

LIMA-MOC

Impact plus faible de l'initialisation en aérosols, même si sur le domaine, on a encore plus de pluie avec C-IFS

CAS du 24-11-2015

LWC

Précipitations
cumulées sur 24h

Moins de LWC avec LIMA qu'avec ICE3, même aucun nuage avec C-IFS (et moins de pluie sur ce cas).
LIMA-MOCAGE encore une fois très proche de LIMA-Ref

CAS du 01-11-2015

ICE3-Ref

ICE3-Ref avec condensation sous maille

ICE3-Ref

ICE3-Ref avec condensation sous maille

LIMA-Clim

LIMA-Clim avec sédimentation du brouillard

LIMA-Clim

LIMA-Clim avec sédimentation du brouillard

→ Sensibilité importante à la condensation sous maille dans ICE3, et à la sédimentation du brouillard dans LIMA

Conclusions / Perspectives

- Dépôt :
 - Processus manquant codé, impact significatif .
 - Validation/tuning encore nécessaire avant une mise en oper : utilisation des données de BURE-2016 (mesures du dépôt), formulation plus physique f(LAI, turbulence...)
- Initialisation de LIMA dans AROME :
 - techniquement possible à partir de C-IFS ou MOCAGE
 - tests sur les cas de BURE-2015 ont montré que les aérosols de C-IFS modifiaient les simulations (LWC plus faibles car moins de CCN). LIMA-MOCAGE très proche de la référence car beaucoup plus de CCN que LIMA-CIFS.
 - Travail nécessaire sur la condensation sous maille dans LIMA
- Stage en cours avec AROME@500m pour préparer la future campagne brouillard (cf présentation A. Dabas) qui sera très utile pour améliorer le modèle.