Vers un jeu de données climatiques à résolution kilométrique sur la France : un premier regard sur les runs

CNRM-AROME cy46t1

Elizabeth Harader-Coustau¹, Antoinette Alias¹, Margot Bador², Sébastien Bernus³, **Cécile Caillaud**¹, Amarys Casnin¹, Léa Corneille¹, Clotilde Dubois⁴, Manon Gévaudan¹, Hanh Le³, Aude Lemonsu¹, Romain Lenoble¹, Diego Monteiro¹, Pierre Nabat¹, Lilian Noiro^{1,2}, Mayeul Quenum¹, Samuel Somot¹

¹Météo-France, CNRS, CNRM ²CECI, CNRS-CERFACS, ³Météo-France, DCSC, ⁴Météo-France, DIROI, ⁵IRD

CP-RCM

Convection

Permitting Regional
Climate Model

CRM

Cloud Resolving Model

Quelle
appellation pour
notre modèle ?

km-RCM

kilometre-scale
Regional Climate
Model

CPM

Convection
Permitting Model

CP-RCM

Convection

Permitting Regional

Climate Model

on paramétrise

encore la convection

peu-profonde

km-RCM

kilometre-scale

Regional Climate

Model

CRM

Cloud Resolving Model

*non, on utilise un
schéma de nuages*

inclut aussi divers CPM

modèles PN et

CFD

Convection

Permitting Model

Une petite histoire de la modélisation climatique régionale au CNRM

	début du projet AROME	premiers runs opérationnels en PNT 2.5 km			
	2002	2008			
1990s					
développement des premiers modèles régionaux de climat	2005	2016	2020	2025	
	premiers runs climat ALADIN au CNRM	premiers runs climat cy38 AROME à 2.5 km	plusieurs domaines en cy41 Métropole et Réunion	premiers runs continus en climat à 2.5 km cy46	Métropole et OM

Seity et al., 2011. , Caillaud, thèse 2023., Radu et al. , 2008, Samuel Somot

Une petite histoire d'AROME

2016

2020

cy38

cy41, surfex7.3

Domaine
SUDE

Domaine
ALPX-3

Domaine
NWE-3

Domaine
REU-3

Nouveautés

- cy46t1, SURFEX v8.0
- changements surface importantes
- environ 240 variables horaires en sortie
- 10a par mois
- 40 noeuds
- nouveaux diagnostics : foudre, images satellites simulées

Services Climatiques : SOCLE
Projet Européen : I4C

Surface

Ancienne version

Schémas ISBA 3L-D95
+ 1 seul patch

Noilhan and Planton (1989)
Douville et al. (1995)

Nouvelle version *Monteiro et al. (2024)*

Schémas ISBA DIF-ES
Meilleure représentation des
processus sol et neige

Decharme et al. (2011)

+ 3 patches

Prise en compte des
hétérogénéités sous-maille

+ GFLUX

Source : Diego Monteiro, Léa Corneille, Aude Lemonsu, Tiago Machado

**La version de l'équipe ville en cy46t1 inclut 12 patches.

Echanges turbulents océan-atm: **COARE3** (Ancienne version); **ECUME6** (Nouvelle version)

Images : Caillaud, C ;
Monteiro et al. 2024

Surface : Neige

Monteiro et al. (2024)

Schéma
Douville 95 :
une couche
neige, 1 patch

3 patches : bilan
d'énergie et
mass; réduction
du flux de
chaleur
sol-surface
12 couches
neige

Amélioration de la durée et la quantité de l'enneigement sur les Alpes.

Images : Caillaud, C, Monteiro, D.

Surface : Ville

Ancienne version

TEB-HIST

ISBA-DF

Masson (2000)

Boone (1999)

traitement séparé des surfaces
artificialisées avec TEB et
naturelles avec ISBA

TEB-Veg

Lemonsu et al. (2012)

inclusion des surfaces végétalisées
dans le canyon urbain; interactions
radiatives et énergétiques

Nouvelle version

TEB-Veg + BEM

Bueno et Pigeon (2012)

BEM : building energy module;
chauffage et climatisation

+indicateurs confort
thermique basé sur le UTCI

AROME : run d'évaluation

Période : 1959-2023, année en cours 2008

Images : Caillaud, C

- SST : journalière, calculée à partir des SST mensuelles lissées sur 3 mois
- LBCs ERA5 : travaux sur la conversion des grib du tl639 à venir
- aérosols ALDERA

Premiers résultats

Outils

- Atlas d'évaluation CLIMAF

Observations

- E-OBS : base de données grillées européen à ~10 km; précipitation
- CRU TS4 : observations grillées à 50 km global
- ERA5 : réanalyse global, 50 km et 30 km
- à remplacer à terme par PRISCILIA (pr), ANASTASIA(tas) et COMEPHORE(pr)

Autres Modèles

- ALADIN forcé par ERA5, domaine Europe

Variables

- psl, tas et pr

Periode

- 1959-1998

psl

AROME - ERA5, annuel

AROME - ALADIN, annuel

AROME - ALADIN, hiver

- Comparaison avec ERA5 et un éval ALADIN EuroCORDEX
- La psl reste proche du forcéur ERA5 : notre simulation est bien contrainte par les LBCs pour la grande échelle
- AROME est plus creux qu'ALADIN sur la Méditerranée et l'Espagne (renforcée en hiver)
 - AROME plus contraint par ERA5
 - Variabilité interne ALADIN sur un plus grand domaine

Focus sur l'été : tas

AROME - ERA5

AROME - ALADIN

AROME - CRU

- Dans les vallées et plaines, CRU représente mal la température
- Dans les zones accidentées, les variations biais chaud/froid sont probablement dues à une meilleure représentation du relief dans AROME que dans les obs/réanalyses
- Visibilité des villes grâce au schéma TEB

Besoin de faire une validation approfondie basé sur les obs haute résolution et sur les reliefs.

Impact résolution sur neige : tas en hiver

AROME - ALADIN

AROME - CRU

- En altitude : plus froid que CRU et plus chaud que ALADIN
- AROME corrige une partie du biais froid d'ALADIN en altitude

précipitation

AROME - ERA5

AROME - E-OBS

AROME - ALADIN

- La pr reste proche de ERA5, mais systématiquement plus sèche en moyenne
- Plus humide que E-OBS, en particulier reliefs au vent
- Spin-up spatial : assèchement au vent en limite de domaine ouest

Historique et scénario continus

Période : 1990-2100, année en cours 2054

Membres :

- CNRM-ESM2-1 r1 (SSP3-7.0), Cécile Caillaud, en cours
- CNRM-ESM2-1 r14 (SSP3-7.0) : 1990-1998, CNRM-ESM2-1 r15 (SSP3-7.0) : 1990-2002, Sébastien Bernus

Perspectives

- Etude des tendances et extrêmes de température et précipitation de 1959 à 2023 (stage Mathis CHEVE janvier à juillet 2025)
- Biais vis à vis observations haute résolution
- Historique et scénario
- Fin de la simulation prévu : début juin

Merci !